# Abricots, pêches et nectarines

Débourrement | Préfloraison | Floraison | Postfloraison | Eté | Récolte

## Maladies

| | | |
|---|---|---|
| Maladie criblée et cloque du pêcher | **Kocide 2000** 4–6,4 kg/ha ou **Oxycuivre 35** 3 kg/ha | Max. 4 kg de cuivre métal par hectare et année. |
| | **Bordeaux S** 8–12 kg/ha | |
| | **Cupric Flow** 8–12 l/ha | |
| Oïdium, maladie criblée et moniliose (pourriture sur fleurs, rameaux et fruits) | Max. 4 applications/année. **Slick** 0,32 l/ha + **Captan S WG** 1,6 kg/ha | |
| Oïdium uniquement dans les pêches et les nectarines | **Tofa** 0,15 l/ha | Délai d'attente: 21 jours. |
| Maladie criblée et moniliose | **Amistar** 1,6 l/ha | Au plus tard jusqu'à fin floraison. |
| Maladie criblée | **Captan S WG** 2,4 kg/ha | 2–3 applications postfloraison. |
| Moniliose des fleurs et des rameaux | **Armicarb** 4,8 kg/ha | Pour l'éclaircissage des fruits en pleine floraison, 2 × 10–15 kg/ha dans un délai de 3–5 jours. |
| | L'ajout d'Anti-Mousse S réduit la formation de mousse. | |
| | Floraison jusqu'à 50 % du calibre des fruits. **Fezan** 0,48 l/ha | Max. 3 applications par parcelle et année. |
| Moniliose des fleurs et des rameaux | **Avatar** 1 kg/ha | |

Stratégie moniliose: 1ère application début floraison, 2è application en pleine à fin floraison, 3è application au stade petits fruits.

## Ravageurs

| | | |
|---|---|---|
| Puceron | **Gazelle SG** | **Gazelle SG** 0,015 % (240 g/ha) |
| | **Pirimor** | **Pirimor** 320–640 g/ha |
| Acarien | **Nissostar** 0,32 l/ha 1 seule application/année. | **Nissostar** 0,32 l/ha Jusqu'à fin juin. |
| Cheimatobies, hyponomeutes et tordeuse de la pelure | **Wormox** 0,8–1 kg/ha | **Wormox** 0,8–1 kg/ha |
| Tordeuse orientale du pêcher, carpocapse | **CheckMate** Dispenser Arbo CM-XL 2–3 Puffer/ha ou 300–400 Dispenser/ha | |
| | Mise en place fin mars. Le nombre de dispensers dépend de la surface du verger. A cas de doute, prendre contact avec notre service externe. Condition: attaque faible lors de l'année précédente (pas plus de 1–2 %). | |
| Confusion sexuelle contre le carpocapse et la tordeuse de la pelure | **CheckMate** Leaf Multi 2–3 Puffer/ha ou 300–400 Dispenser/ha | |
| | Mise en place fin mars. Le nombre de dispensers dépend de la surface du verger. A cas de doute, prendre contact avec notre service externe. Condition: attaque faible lors de l'année précédente (pas plus de 1–2 %). | |
| | 3 applications de 1 l/ha. Convient également contre les infestations tardives. Durée d'efficacité: 12 jours. A conserver au frais à env. 5 °C. + Lufix 2 l/ha (protection contre les UV). | **Carpovirusine Evo2** 1 l/ha |
| Tordeuse orientale du pêcher, carpocapse, petite mineuse | | **Atac** 3,2 kg/ha<br>Max. 2 applications. Délai d'attente: 3 semaines. |
| Tordeuse orientale du pêcher | **Elvis** 0,2 l/ha<br>Délai d'attente: 7 jours. | |