Abricots, pêches et nectarines

Débourrement	Préfloraison	Floraison	Postfloraison	Eté	Récolte

Régulateur de croissance

Eclaircissage du fruit uniquement en abricot	**Armicarb** 10–15 kg/ha 2 × 10–15 kg/ha à intervalles de 3–5 jours. 1re application pleine floraison BBCH65.

Pour une nutrition optimale

Physio-activateur	Filtrat d'algue avec Bore, Mg, Mn, SO_3.	**3 × Goëmar Start** 2 l/ha	Applications jusqu'à fin floraison.
Stimulant	**Radi S** 3 × 3,5 l/ha Favorise l'activité racinaire et la formation de racines fines, augmente ainsi l'absorption des nutriments et accélère le transport des hormones de croissance dans les plantes.		
Activateur de la plante et du sol	**Triagol** 2,5 l/ha Stimule les plantes par les feuilles et le sol. Augmente la disponibilité et l'assimilation des oligo-éléments et des principaux nutriments. Idéal en mélange avec nos herbicides et fongicides. Ajouter le produit en dernier dans le réservoir.		

Désherbage

Herbicide racinaire	**Nizo S** 2,5–4 l/ha (dicotylédones et graminées) 5–6,25 l/ha (chiendent)	Application en hiver pendant le repos de la végétation. Meilleure efficacité sur sol frais (non autorisé en PER).	
Mauvaises herbes annuelles et vivaces	**Roundup PowerMax** 1,5–7,5 l/ha	idem	Sur mauvaises herbes levées jusqu'à fin juin, dès la 2e année de la plantation.
Graminées	**Xenturion** 1–3 l/ha	**Xenturion** 1–3 l/ha	
Rejets	**Mizuki** 0,5 %	**Mizuki** 0,5 % A partir de la 3e année de plantation, max. 2 applications par parcelle/année.	

Après chaque application herbicide, nettoyer le pulvérisateur avec le produit All Clear Extra ou Vapi Clean.