Choux (toutes les variétés)

Chou à feuilles, choufleur, chou pommé, chou de Bruxelles



Désherbage

Avant la plantation	Sitradol Tec	4–5 l/ha	Réduire le dosage sur sol léger et mi-lourd.	
Après la plantation. Dicotylédones et graminées annuelles		Devrinol Plus	3 I/ha	
		ou	Traiter après la plantation et arroser.	
		Devrinol Plus + Cargon S	2 I/ha 0,15–0,25 I/ha	
Repousses de céréales, pâturins, millets et autres graminées	Application seule- ment dans les choux pommés. Très bonne efficacité contre les pâturins.	Select 0,5–1 I/ha + Zofal R 1 I/ha		Délai d'attente pour 0,5 l/ha: 4 semaines; pour 1 l/ha: 8 semaines.
			Xenturion 1–3 l/ha	

Maladies

Taches des feuilles, oïdium, rouille blanche, mildiou, botrytis (efficacité partielle)	Application préventive, max. 3 ×/année. Délai d'attente: 14 jours.	Amistar 1 l/ha	
Rouille blanche, taches annulaires du chou, maladie des taches noires du chou	Traitement préventif du chou dès la formation de la tête. Max. 4 applications/ année. Délai d'attente: 14 jours.	Slick 0,5 l/ha	
Nervures noires du chou, oïdium, phoma, pseudomonas, pourriture molle	4 applications. Délai d'attente: 3 semaines.	Oxycuivre 35 3 kg/ha	
Oïdium		Armicarb 3 kg/ha	En cas de danger d'infestation. Délai d'attente: 3 jours.

Après chaque application herbicide, nettoyer le pulvérisateur avec le produit All Clear Extra ou Vapi Clean.

