Viticulture

	Débourrement	Pousses 5 cm	Préfloraison	Floraison	Postfloraison	Fermeture des grappes

Maladies

Mildiou avec effet secondaire contre le botrytis	**Quadris Max** 0,2 % (1,2–3,2 l/ha)	Excoriose: Dosage 0,2 % soit 1,6 l/ha max. stade BBCH 13
	Fantic F 0,2 % (1,6–2,4 kg/ha)	
	Amarel-Folpet DF 0,15 % (1,2–2,4 kg/ha)	
	Avec un bon effet curatif.	**Eleto** 0,065 % (0,5–1 l/ha) + **Folpet 80 WDG** 0,1 % (0,8–1,6 kg/ha)
	Stamina S 0,2 % (1,6–3,2 l/ha) + **Folpet 80 WDG** 0,1 % (0,8–1,6 kg/ha)	
	.	**Sporex** 0,016 % (0,25 kg/ha) + **Folpet 80 WDG** 0,125 % (1,6 kg/ha)
	Amarel Cuivre DF 0,25 % (4 kg/ha)	
Mildiou	Action stoppante, deux fois dans les 7 jours.	**Amarel-Folpet DF** 0,15 % (1,2–2,4 kg/ha) + **Leimay** 0,36 l/ha
Oïdium Action de contact	**Soufralo** 0,1–0,2 % (1,2–3,2 kg/ha)	
	Lors de forte pression de maladie 0,2–0,4 % (3,2–6,4 kg/ha).	
	Armicarb 0,2 % (1,6–3,2 kg/ha)	
Oïdium Application stoppante	**Armicarb** 3,2 kg/ha + **Sufralo** 3,2 kg/ha	
	Répéter l'application après 7 jours.	
Oïdium Effet pénétrant	Avec tous nos anti-oïdium – Appliquer alternativement – Miscible avec nos produits anti-mildiou	**Talendo** 0,025 % (0,2–0,4 l/ha)
		Cyflamid 0,03 % (0,24–0,48 l/ha)
		Tofa 0,0095 % (0,076–0,15 l/ha)
		Fezan 0,025 % (0,25–0,4 l/ha) ou **Slick** 0,0125 % (0,1–0,2 l/ha)
Oïdium (effet partiel)		**Vacciplant** 0,125 % (0,5–2 l/ha)
Mildiou et partiellement botrytis	Dernière application jusqu'à fin août.	**Kocide 2000** 0,125–0,2 % ou **Oxycuivre 35**
		Bordeaux S 0,25 %
		Cupric Flow 0,25 %