Viticulture

	Débourrement	Pousses 5 cm	Préfloraison	Floraison	Postfloraison

Désherbage

Solution idéale	**Chikara 25 WG** 80–200 g/ha + Gondor 0,5 l/ha **+ Roundup PowerMax** 2,5 l/ha	Les dosages sont valables pour les surfaces traitées. Effet foliaire et résiduaire. Applications dès début avril jusqu'à mi-mai. Avant débourrement ou en sous-foliaire, traiter la prêle, la vergerette annuelle et du Canada dès fin juillet. Dosage 200 g/ha. Prudence sur nouvelles plantations. A appliquer dès la 4e année de plantation.
Avec effet permanent	**Roundup PowerMax** 2,5 l/ha Application jusqu'à fin juin. A partir de la 2e année de plantation.	
Graminées levées	**Select** 0,5–1 l/ha **Xenturion** 1–2 l/ha	Contre les chiendents et les graminées résistantes.
Herbicide total	**Roundup PowerMax** 1,5–7,5 l/ha Application jusqu'à fin août au plus tard.	
Mauvaises herbes annuelles et graminées	**Roundup PowerMax** 1,5–2,25 l/ha **Natrel** 16 l/ha **+ év. Chikara 25 WG** 80–200 g/ha **+ Gondor** 0,5 l/ha Natrel: effet suffisant seulement sur les jeunes mauvaises herbes (max 5 cm).	
Contre les rejets	**Mizuki** 0,5 % Max. 2 applications à partir de la 3e année de plantation.	