Noyer

	Débourrement	Préfloraison	Floraison	Postfloraison	Eté	Récolte

Lutte contre les maladies

Cochenilles/acariens	**Zofal D** 3,5 % (56 l/ha)	
Maladie criblée, chancre bactérien, anthracnose	**Cuivre**	Max. 4 kg cuivre métal par ha et année.
Fumure foliaire	**Goëmar Start** 0,125 % (3 × 2 l/ha)	
Biostimulant	**Vitaly** 0,125 % (2 l/ha)	
Engrais foliaire à base de soufre	**Prosulf** 2–5 l/ha	

Ravageurs

Mouche de la noix	Max. 2 applications.	**Gazelle SG** 0,02 % (0,32 kg/ha)	Délai d'attente: 4 semaines.
Mouche de la noix BIO	Max. 4 applications.	**Surround** 2 % (32 kg/ha) **+ Lufix** 2 l/ha	
Confusion sexuelle contre le carpocapse et la tordeuse de la pelure		**CheckMate** Puffer Arbo CM/ Dispenser 2–3 Puffer/ha ou 300–400 Dispenser/ha	
		CheckMate Leaf Multi 2–3 Puffer/ha ou 300–400 Dispenser/ha	
Carpocapse		**Elvis** 0,32 l/ha	Délai d'attente: 3 semaines.
		Atac 3,2 kg/ha	Délai d'attente: 3 jours. Max. 2 applications, seulement dans les cultures fruitières.

Tous les dosages sont basés sur un volume d'arbres de 10 000 m³ par ha (1600 l/ha).