



Karotten

Saat

2-Blatt

4-6-Blatt

8-10-Blatt

3 Wochen vor der Ernte

Unkrautregulierung

Vor der Bodenbearbeitung	Roundup PowerMax 2-4 l/ha	Zum Abbrennen vorhandener Unkräuter vor der Bodenbearbeitung. Rasche Regenfestigkeit (1 Stunde). Wartezeit bis zur Bodenbearbeitung bei einj. Unkräutern nur 6 Stunden.
Vorauflauf	Reglone 3 l/ha	Zum Abbrennen von Unkräutern vor dem Auflaufen der Kulturpflanzen.
	Cargon S 0,25 l/ha + Sitradol SC 1-2,5 l/ha + Dancor 70 WG 100 g/ha	Für schwere – mittelschwere Böden. Sofort nach der Saat einsetzen. Gegen aufgelaufene Unkräuter (im Bes. gegen Schw. Nachtschatten) im Nachauflauf 2 × 1,5 l/ha Sitradol SC.
	oder Cargon S 0,2 l/ha + Dancor 70 WG 100 g/ha	Für leichte und sandige Böden.
Nachauflauf	Im Splitverfahren nach 8 Tagen wiederholen. Dosierung dem Kulturstadium anpassen. Dancor 70 WG max. 300 g/ha und Kultur.	Dancor 70 WG 100 g/ha + Bandur 0,5 l/ha + Gondor 0,5 l/ha
Ausfallgetreide, Rispengras, Hirsen u. a. Gräser	Sehr gute Wirkung gegen Rispengrasarten. Wirkungsverstärkung in alleiniger Anwendung mit 0,5 l/ha Gondor.	Select 0,5-1 l/ha Wartefrist: 8 Wochen.

Schutz vor Krankheiten

Alternaria, Möhrenschwärze	Kontaktfungizid mit guter Regenfestigkeit. Einsatz vor Hitzeperioden sinnvoll. Wartefrist: 21 Tage.	Daco 500 oder Daconil 500 3 l/ha
	Vorbeugend einsetzen, max. 3 Behandlungen pro Saison. Pflanzenstimulierende Wirkung. Wartefrist: 14 Tage.	Amistar 1 l/ha
	Als Folgebehandlungen nach Amistar abwechselnd (max. 3 Behandlungen pro Saison).	
	Wartefrist: 21 Tage. 3 Behandlungen pro Saison.	Fezan 0,6 l/ha
	Wartefrist: 14 Tage. 4 Behandlungen pro Saison.	Slick 0,5 l/ha
Als Mischpartner 1 kg/ha oder als abstoppende Wirkung bei einer starken Infektion.	Kocide 2000 5-7 kg/ha	Wartefrist: 21 Tage.